

BACHELOR OF SCIENCE (B.Sc.)
Term-End Examination

December, 2012

PHYSICS

**PHE-04 : MATHEMATICAL METHODS IN
PHYSICS-I**

Time : 1½ hours

Maximum Marks : 25

B.Sc. EXAMINATION,

**PHE-4 : MATHEMATICAL METHODS
IN PHYSICS-I**

&

**PHE-5 : MATHEMATICAL METHODS
IN PHYSICS-II**

Instructions :

1. *Students registered for both PHE-4 & PHE-5 courses should answer both the question papers in two separate answer books entering their enrolment number, course code and course title clearly on both the answer books.*
2. *Students who have registered for PHE-4 or PHE-5 should answer the relevant question paper after entering their enrolment number, course code and course title on the answer book.*

Note : Attempt all questions. The marks for each question are given against it. Symbols have their usual meanings. You may use log tables.

1. Attempt any three parts :

4x3=12

(a) Determine the vector \vec{A} perpendicular to

the vectors $\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ and

$$\vec{C} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}.$$

(b) Show that

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = A^2 B^2 - (\vec{A} \cdot \vec{B})^2.$$

(c) Determine the directional derivative of the scalar field $f = x^2 + yz$ at the point $(1, 2, 2)$ in the direction of the unit vector

$$\hat{A} = \frac{1}{\sqrt{6}} \left(2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} \right).$$

(d) The position vector \vec{r} of a particle moving on a curve is given by

$\vec{r} = 3t^2\hat{i} + 4t\hat{j} + 2\hat{k}$. Determine the angular momentum of the particle about the origin.

(e) Spherical polar coordinates $u_1 = r$, $u_2 = \theta$, $u_3 = \phi$ are related to the cartesian coordinates x , y and z as follows :

$$x = r \sin\theta \cos\phi$$

$$y = r \sin\theta \sin\phi$$

$$z = r \cos\theta.$$

Calculate g_{12} , g_{13} and g_{23} to show that the spherical coordinate system is orthogonal.

2. Calculate the work done in going from (1, 1) to (3, 3) along the path $x=y$ by the force 5

$$\vec{F} = (x - y) \hat{i} + (x + y) \hat{j}.$$

OR

Using Stokes' theorem show that if the work done by a force along a closed path is zero, the curl of the force field is zero. 5

3. The probability of surviving an attack of dengue is 0.2. What is the probability that at least one person out of 10 suffering from dengue will survive ? 3

OR

A continuous random variable X lying between 0 and ∞ has the probability distribution 3

$$P(x) = e^{-x} \text{ Obtain } \langle x^2 \rangle.$$

4. The resistance of a coil is measured as a function of temperature and is given by 5

T ($^{\circ}\text{C}$) =	40	50	60	70	80
R (Ω) =	6	7	8	9	10

Obtain $R = a + bT$ for the best fit.

OR

Derive the expression for the mean of a random variable with a Poisson distribution : 5

$$P(x; m) = \frac{e^{-m} m^x}{x!}$$

विज्ञान स्नातक (बी.एस.सी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2012

भौतिक विज्ञान

पी.एच.ई.-04 : भौतिकी में गणितीय विधियाँ-I

समय : 1½ घण्टे

अधिकतम अंक : 25

बी.एस.सी. परीक्षा,

पी.एच.ई.-4 : भौतिकी में गणितीय विधियाँ-I

एवं

पी.एच.ई.-5 : भौतिकी में गणितीय विधियाँ-II

निर्देश :

- जो छात्र पी.एच.ई.-4 और पी.एच.ई.-5 दोनों पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत हैं, दोनों प्रश्नपत्रों के उत्तर अलग-अलग उत्तर पुस्तिकाओं में अपना अनुक्रमांक, पाठ्यक्रम कोड तथा पाठ्यक्रम नाम साफ-साफ लिखकर दें।
- जो छात्र पी.एच.ई.-4 या पी.एच.ई.-5 किसी एक के लिए पंजीकृत हैं, अपने उसी प्रश्नपत्र के उत्तर, उत्तर-पुस्तिका में अपना अनुक्रमांक, पाठ्यक्रम कोड तथा पाठ्यक्रम नाम साफ-साफ लिखकर दें।

नोट : सभी प्रश्न करें। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। आप लॉग सारणियों का प्रयोग कर सकते हैं।

1. कोई तीन भाग करें :

4x3=12

(a) संदिश \vec{A} ज्ञात करें जो संदिश

$$\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} \text{ और}$$

$$\vec{C} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k} \text{ के लम्बवत् हो।}$$

(b) दिखाएँ कि :

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = A^2 B^2 - (\vec{A} \cdot \vec{B})^2.$$

(c) एक संदिश $\hat{A} = \frac{1}{\sqrt{6}} \left(2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} \right)$ की दिशा

में, बिंदु (1, 2, 2) पर अंदिश क्षेत्र $f = x^2 + yz$ का दिक्-अवकलज प्राप्त करें।

(d) एक वक्र पर गतिमान एक कण का स्थिति संदिश \vec{r} निम्नलिखित है :

$$\vec{r} = 3t^2\hat{i} + 4t\hat{j} + 2\hat{k}$$

मूल बिंदु के प्रति कण का कोणीय संवेग प्राप्त करें।

(e) गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक $u_1 = r$, $u_2 = \theta$, $u_3 = \phi$ और

कार्तीय निर्देशांकों x, y, z के बीच निम्नलिखित संबंध हैं :

$$x = r \sin\theta \cos\phi$$

$$y = r \sin\theta \sin\phi$$

$$z = r \cos\theta.$$

g_{12}, g_{13} और g_{23} परिकलित करके दिखाएँ कि गोलीय निर्देशांक तंत्र लांबिक है।

2. बल $\vec{F} = (x - y) \hat{i} + (x + y) \hat{j}$ द्वारा पथ $x=y$ के 5

अनुदिश बिंदु $(1, 1)$ से $(3, 3)$ तक जाने में किया गया कार्य परिकलित करें।

अथवा

स्टोक्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए दिखाएँ कि यदि एक बल द्वारा 5
एक संवृत पथ में किया कार्य शून्य हो, तो बल क्षेत्र का कर्ल शून्य होता है।

3. डेंगू के आक्रमण के बाद बचने की प्रायिकता 0.2 है। डेंगू से 3
पीड़ित 10 व्यक्तियों में से कम से कम एक व्यक्ति के बचने की प्रायिकता क्या है?

अथवा

0 और ∞ के बीच स्थित एक संतत यादृच्छिक चर X का 3
प्रायिकता बंटन निम्नलिखित है :

$$P(x) = e^{-x}$$

$\langle x^2 \rangle$ प्राप्त करें।

4. तार की एक कुंडली के प्रतिरोध को तापमान के फलन के रूप 5
में मापा जाता है और वे माप निम्नलिखित हैं :

$T (^{\circ}\text{C}) =$	40	50	60	70	80
$R (\Omega) =$	6	7	8	9	10

श्रेष्ठतम आसंजन के लिए $R = a + bT$ प्राप्त करें।

अथवा

निम्नलिखित प्वासों बंटन वाले एक यादृच्छिक चर के माध्य के
लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें।

$$P(x ; m) = \frac{e^{-m} m^x}{x!}$$

BACHELOR OF SCIENCE (B.Sc.)**Term-End Examination****December, 2012****PHYSICS****PHE-05 : MATHEMATICAL METHODS IN
PHYSICS-II***Time : 1½ hours**Maximum Marks : 25*

Note : Attempt all questions. The marks for each question are indicated against it. Symbols have their usual meanings.

1. Attempt any three parts : **4x3=12**

(a) Show that the following equation is exact

$$\text{and then solve it : } \left(x + \frac{2}{y} \right) dy + y dx = 0.$$

(b) Obtain the integrating factor and solve the

$$\text{equation : } x \frac{dy}{dx} - 2y = x^4$$

(c) Determine all the first and second order partial derivatives of the function :

$$f(x, y) = x e^y + y e^x$$

(d) Separate the following PDE into two ODEs :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi(x, y) + V \psi(x, y) \\ = E \psi(x, y).$$

(e) Find the particular solution of

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3 \frac{dy}{dx} = 4 \sin x.$$

2. Determine the singular point of the following equation and specify its nature : 6

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + (x^2 + 2)y = 0$$

Obtain the indicial equation and determine its roots.

OR

A source of emf E is connected to an LR circuit. Establish the differential equation governing the current I in the circuit. Solve it for the condition : 6
I = I₀ at t = 0.

3. Expand the full wave rectified potential in Fourier series : 7

$$V = V_0 \sin \omega t \quad 0 < \omega t < \pi$$

$$= -V_0 \sin \omega t \quad -\pi < \omega t < 0$$

OR

The diffusion of particles in the atmosphere is governed by the diffusion equation :

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{k} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \gamma^2 u(x, t) \quad \text{where}$$

$u(x, t)$ is the concentration density of particles.
The general solution of this equation is given by

$$u(x, t) = (C_1 \sin \lambda x + C_2 \cos \lambda x) e^{-(\gamma^2 + \lambda^2) kt}$$

Obtain the particular solution under the following conditions.

$$u(x, 0) = u_0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial x} = 0$$

$$u(L, t) = 0$$

विज्ञान स्नातक (बी.एस.सी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2012

भौतिक विज्ञान

पी.एच.ई.-05 : भौतिकी में गणितीय विधियाँ-II

उम्मेद : 1½ घण्टे

अधिकतम अंक : 25

नोट : सभी प्रश्न करें। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं।

कोई तीन भाग करें :

$4 \times 3 = 12$

(a) दिखाएँ कि निम्नलिखित समीकरण यथातथ है और हल

$$\text{करें : } \left(x + \frac{2}{y} \right) dy + y dx = 0.$$

(b) निम्नलिखित समीकरण का समाकलन गुणक प्राप्त करें

$$\text{और हल करें : } x \frac{dy}{dx} - 2y = x^4$$

(c) निम्नलिखित फलन के सभी प्रथम और द्वितीय कोटि आंशिक अवकलज प्राप्त करें :

$$f(x, y) = x e^y + y e^x$$

- (d) निम्नलिखित आंशिक अवकल समीकरण को दो साधारण अवकल समीकरणों में पृथकृत करें :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi(x, y) + V \psi(x, y) = E \psi(x, y).$$

- (e) निम्नलिखित समीकरण का विशेष समाकल प्राप्त करें :

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3 \frac{dy}{dx} = 4 \sin x.$$

2. निम्नलिखित समीकरण का मूल बिंदु प्राप्त करें और उसे वर्गीकृत करें :

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + (x^2 + 2)y = 0 \text{ इसका घातांकी}$$

समीकरण और उसके मूल प्राप्त करें।

अथवा

emf के एक स्रोत को एक LR परिपथ में लगाया गया है। परिपथ की धारा I के लिए अवकल समीकरण लिखें और निम्नलिखित प्रतिबंध के लिए उसका हल प्राप्त करें :

$$I = I_0 \text{ at } t = 0 \text{ के लिए।}$$

3. निम्नलिखित पूर्ण-तरंग रेक्टिफायर विभव का फूरिए श्रेणी प्रसार 7
करें :

$$V = V_0 \sin \omega t \quad 0 < \omega t < \pi \\ = -V_0 \sin \omega t \quad -\pi < \omega t < 0$$

अथवा

- वायुमंडल में कणों का विसरण निम्नलिखित विसरण समीकरण 7
द्वारा नियंत्रित होता है :

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{k} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \gamma^2 u(x, t) \text{ यहाँ } u(x, t)$$

कणों का सांद्रण घनत्व है। इस समीकरण का व्यापक हल
निम्नलिखित है :

$$u(x, t) = (C_1 \sin \lambda x + C_2 \cos \lambda x) e^{-\left(\gamma^2 + \lambda^2\right) kt}$$

निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन इसका विशेष हल प्राप्त करें :

$$u(x, 0) = u_0 \\ \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} = 0 \\ u(L, t) = 0$$
